

UNIfears® säilitusainevaba

silmatilgad, lahus, säilitusainevaba

1. Mis on UNIfears säilitusainevaba ja milleks seda kasutatakse

UNIfears säilitusainevaba on hüpromelloosi ja dekspantenooli sisaldav silmatilgade lahus. Tootel on kaitsev, rakke taastav ja niisutav toime.

Hüpromelloos moodustab silma sarvkesta pinnale ajutise kaitsva kihi, niisutab silma pinda ja kompenseerib vähest pisarateket. See pärsib „kuiva silma“ tunnet, lisaks leevendab see kergemaid mittenakkuslikke silmaärritusi. Dekspantenool (B-rühma vitamiin) aitab taastada sarvkesta pinna rakke (epitelisatsioon).

UNIfears säilitusainevaba ei sisalda säilitusaineid, seega see sobib ideaalselt kontaktläätsede kandjatele ja tundlike silmadega inimestele.

UNIfears säilitusainevaba pakub kauakestvat leevendust järgmistel juhtudel:

- vähenenud pisarateke, kuiva silma sündroomi korral (*keratoconjunctivitis sicca*)
- vigastuste ja sarvkesta erosiooni korral
- pärast silmaoperatsiooni
- ebamugavustunde korral (põletus, sügelus, võõrkehatus), sellised sümptomid võivad olla seotud väliste teguritega (nt õhukonditsioneer, tuul, saastus, suits, tolm);
- silmade suurenenud pingutuse (pikaajaline töö arvuti taga) ja nägemisraskuste korral päeva vältel
- kontaktläätsede kandmisel.

UNIfears säilitusainevaba tohivad kasutada täiskasvanud, noorukid ja lapsed.

2. Mida on tarvis teada enne UNIfears säilitusainevaba kasutamist

Ärge kasutage UNIfears säilitusainevaba:

- kui olete käesoleva preparaadi mõne koostisaine suhtes allergiline
- silma söövituse ägedas faasis, kuni söövitav aine on sidekestalt eemaldatud ja surnud kude on täielikult eemaldatud

Kui kasutate muid silmatooteid, on üldiselt soovitatav oodata vähemalt 5 minutit enne uue toote kasutamist.

3. Kuidas toodet UNIfears säilitusainevaba kasutatakse

Soovituslik annus on üks tilk 2–3 korda päevas.

Vajaduse korral võib kasutada ka tihedamini.

UNIfears säilitusainevaba võib kasutada pikaajaliselt.

Hoiatus


Pärast toote kasutamist võib tekkida mööduv kerge põletustunne või nägemise hägustumine. Enne autojuhtimist või masinatega töötamist oodake, kuni teie nägemine on selge.

Kontaktläätsede kandjad

UNIfears säilitusainevaba võib kasutada kontaktläätsede kandmise ajal.

Ettevaatusabinõud enne kasutamist

1. Peske käed ja istuge või seiske mugavalt.
2. Keerake pudelikork lahti



3. Hoidke pudelit pöidla ja teiste sõrmede vahel allapoole suunatult.
4. Enne esimest kasutuskorda on soovituslik pigistada esimene tilk mujale kui silma, pigistades õrnalt pudelit, sest tugeva ja ebakorrapärase pigistamise korral võib lahus tulla välja suures koguses.
5. Kasutage sõrme, et tõmmata oma silma alumine silmalaua õrnalt alla.




6. Asetage tilguti ots silma lähedale, kuid nii, et see ei puudutaks silma ega silmaga külgnevaid piirkondi.


7. Pigistage pudelit õrnalt, nii et ainult 1 tilk läheb silma. Seejärel laske alumine silmalaug lahti ja sulgege aeglaselt silm, nii et UNIfears jaotub ühtlaselt silma pinnale.

Järgmise tilga jaoks laske õhk plastpudelisse tagasi oma algsesse olekusse ja jätkake seejärel tilgutamist vastavalt soovitudele.

Pange tähele, et pudeli pigistamise ja tilga langemise vahele võib jääda mõni sekund. Pudelit ei tohi liiga kõvasti pigistada.



8. Kui vaja, korrake protseduuri teise silmaga.



9. Pärast kasutamist on vajalik pudelit üks kord alla poole raputada, ilma tilguti otsa puutumata, et eemaldada igasugune lahuse jääk otsikult. See on vajalik silmatilkade steriilsuse tagamiseks ja järgmise tilga kergemini väljutamiseks järgmisel kasutuskorral.

10. Kohe pärast kasutamist sulgege pudelikork tihedalt.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Harva võib kohe pärast manustamist tekkida kerge lühiajaline põletustunne või allergiline reaktsioon mõnele toote koostisainele, samuti võivad ripsmed ajutiselt kokku kleepuda.

Kui tekib mõni loetletud sümptom või ebatavaline reaktsioon, võtke ühendust arsti või apteekriga.

5. UNIfears säilitusainevaba koostis

Hüpromelloos 5 mg 1 ml kohta, dekspantenool, naatriumkloriid, dinaatrium-edetaatdihüdraat, puhastatud vesi.

6. Kuidas toodet UNIfears säilitusainevaba säilitatakse ning muu teave

Säilitage pudelit originaalpakendis 25°C juures.

Kaitske külma ja külmumise eest.

Hoidke preparaat laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage preparaati pärast etiketile või karbile liivakella ikooni kõrvale märgitud kehtivusaja möödumist. Kehtivusaeg tähistab märgitud kuu viimast päeva.

Ärge kasutage toodet UNIfears säilitusainevaba kauem kui 3 kuud pärast pudeli esmakordset avamist.

Pakendi suurus: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovakkia Vabariik

Tel: +421 2 4333 3786

Faks: +421 2 4363 8743

e-post: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu



Kasutusjuhendit uuendati viimati aprillis 2020.



Orišková 11, 821 05 Bratislava
Slovenská republika

